

芝生用除草剤

農林水産省登録  
第22082号



バリケード®

フロアブル

イネ科土壌処理剤の新提案!



バリケード®  
フロアブル

syngenta.

## ■特長

◆安定した土壌処理層により抜群の除草効果を示します

◆フロアブル製剤のため、計量・調製が簡単で作業効率の向上に役立ちます

◆幅広い場面で使用ができます

## ■適用内容

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	プロジアミンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
日本芝 西洋芝 (パーミュダグラス)	—	一年生雑草 (キク科を除く)	春夏期雑草 発生前	125～250mℓ/10a	200～300ℓ/10a	2回以内	全面土壌散布	2回以内
			秋冬期雑草 発生前	140～260mℓ/10a				
樹木等	公園、庭園、提とう、 駐車場、道路、運動場、 宅地、のり面、鉄道等		雑草発生前	250～500mℓ/10a	100～250ℓ/10a		植栽地を除く 樹木等の周辺地に 全面土壌散布	

## ■効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用前によく振ってから使用してください。
- 発芽後の雑草に対しては、効果が劣るので必ず雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
- キク科雑草に対しては効果がないので、それらの優占する所では使用しないでください。
- 激しい降雨の予想される場合は、使用をさけてください。
- 散布液の飛散や流出によって、周辺の有用作物に影響を及ぼすことのないよう十分に注意して散布してください。
- 散布薬液の飛散によって自動車やカートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、水源池等に本剤が飛散・流入しないように十分注意してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用后十分に洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意してください。また、洗浄した廃液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## ■安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

## ■水産動植物に関する注意

- 水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

**シンジェンタ ジャパン株式会社**  
 プロフェッショナルソリューション事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階  
 TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899  
[www.greencastonline.jp](http://www.greencastonline.jp)

取扱い